



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
28/03/2018

PESCO
(GEMMA RIGONFIA-BOTTONI ROSA)

BOLLA

A SECONDA DELLE SITUAZIONI SIAMO NELLA FASE DI RIPRESA VEGETATIVA PIÙ O MENO AVANZATA PER CUI SI RICORDA CHE, VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI FAVOREVOLI AD INFEZIONI, QUALORA NON SIANO ANCORA STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI, E' NECESSARIO INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA)(MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)
OPPURE
TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)
OPPURE
CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. TRA TIRAM-ZIRAM-CAPTANO AL MASSIMO 3 INTERVENTI CONTRO L'AVVERSITA'.

OPPURE

DODINA (VARI) MAX 2 INTERVENTI/ANNO

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE PER IL CORINEO

CANCRI RAMEALI

ENTRO LA FASE FENOLOGICA DI PRE-FIORITURA, PER I PESCHETI A RISCHIO E' CONSIGLIATO EFFETTUARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO, UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

TIOFANATE METILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (GEMMA RIGONFIA-BOTTONI ROSA)

COCCINIGLIA

E' POSSIBILE INTERVENIRE IN SITUAZIONI DI FORTE INFESTAZIONE, ENTRO LA FASE DI GEMMA RIGONFIA, CON PRODOTTI A BASE DI:
OLIO BIANCO (VARI) IN DOSI DI 1,5-2 KG/HL

ALBICOCCO (FIORITURA)

MONILIA

DA MONITORAGGIO SUL TERRITORIO RISULTA CHE IL PRIMO TRATTAMENTO SIA GIA' STATO ESEGUITO PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LA FASE FENOLOGICA DI CADUTA PETALI PER IL SUCCESSIVO TRATTAMENTO: IN CASO DI PIOGGIA CONTATTARE I TECNICI DI ZONA IN FUNZIONE DI POSSIBILI DEROGHE PER TRATTAMENTI IN FIORITURA.

MELO (INGROSSAMENTO GEMME-PUNTE VERDI)

TICCHIOLATURA E CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA E' CONSIGLIATO EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO GEMME-PUNTE VERDI)

COCCINIGLIA

IL TRATTAMENTO E' CONSIGLIATO SE NON SONO STATI EFFETTUATI TRATTAMENTI SPECIFICI NELL'AUTUNNO PRECEDENTE ED IN PARTICOLARE SE SI E' RISCONTRATA LA PRESENZA DEGLI SCUDETTI SUL LEGNO DI POTATURA.

OLIO BIANCO (VARI)

OLIO BIANCO + ZOLFO (POLITHIOL: SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN ASSENZA DI VEGETAZIONE)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI E INTERESSATE DAL PARASSITA NELLA SCORSA STAGIONE) ED IN CONDIZIONI DI RIALZO DELLE TEMPERATURE, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA WDG, ETC..)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

