



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
29/03/2017

PESCO (FINE FIORITURA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIOIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (CADUTA PETALI)

MONILIA

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA RIUSCITE AD INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MELO

(ORECCHIETTE DI TOPO-MAZZETTI AFFIORANTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO

(ORECCHIETTE DI TOPO-MAZZETTI AFFIORANTI)

TICCHIOLATURA

VISTA LA FASE FENOLOGICA DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO, IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:**

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

CILIEGIO-SUSINO

(FIORITURA)

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

