



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 02
04/04/2018

PESCO **(BOTTONI ROSA)**

AFIDI

SI RICORDA CHE IN QUESTA FASE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

(SI RICORDA CHE IN QUESTA FASE NON È POSSIBILE INTERVENIRE CON ALTRI PRODOTTI NEONICOTINOIDI, IMPIEGABILI SOLO QUANDO È TERMINATA LA FASE DI FIORITURA)

ANARSIA/AFIDE VERDE

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUVALINATE (MAVRIK 20 EW, KLARTAN 20 EW).

AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.

SI RICORDA CHE IL P.A. E' EFFICACE ANCHE CONTRO I TRIPIDI

ALBICOCCO **(PIENA FIORITURA)**

MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI RICORDA CHE **E' STATA CONCESSA LA DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI IN FIORITURA** CONTRO TALE AVVERSITÀ (PER PRODOTTI VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (PUNTE VERDI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

TICCHIOLATURA

NELLE SITUAZIONI DI AVANZATA FASE FENOLOGICA STA INIZIANDO LA FASE DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO: IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (GEMME GONFIE)

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)

SUSINO (BOTTONI SEPARATI)

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)
OPPURE

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

