



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 03**  
28/03/2014

### **PESCO-SUSINO** (FIORITURA)

#### **MONILIA**

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI INFORMA CHE E' STATA CONCESSA LA DEROGA DAL SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE PER INTERVENIRE IN FASE DI FIORITURA CONTRO LA MONILIOSI DELLE DRUPACEE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MICLOBUTANIL** \*(THIOCUR FORTE ETC..)

**FENBUCONAZOLO\*** (SIMITAR 5 EW ETC..)

**TEBUCONAZOLO\*** (FOLICUR SE ETC..)

**PROPICONAZOLO\*** (VARI)

(\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA';)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH)

**CYPRODINIL** (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO CON CIASCUNA S.A.)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO (FINE FIORITURA)

---

### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

#### TIRAM (VARI)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

### MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI (VEDI NOTA PESCO-SUSINO)

## CILIEGIO (BOTTONI BIANCHI)

---

### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

#### THIRAM (VARI)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)

## MELO (ORECCHIETTE DI TOPO)

---

### OIDIO

NEI MELETI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIROIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)**(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (ORECCHIETTE DI TOPO)

---

### TICCHIOLATURA

SIAMO NELLA FASE DI RECETTIVITÀ DELLA COLTURA VERSO IL PATOGENO: IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70 WG)**

OPPURE

**PROPINEB (VARI)**(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI CADUTA PETALI)

OPPURE

**DODINA (VARI)**

OPPURE

**FLUAZINAM (VARI)**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

