



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 03
01/04/2015

ALBICOCCO (FINE-FIORITURA)

MONILIA

PER LE AZIENDE CHE NON SONO ANCORA RIUSCITE AD INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

MICLOBUTANIL *(THIOCUR FORTE)

OPPURE

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR 5 EW)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO* (VARI)

(*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



MELO (ORECCHIETTE DI TOPO)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDIO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

