



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 03
06/04/2017

PESCO (CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, O SU CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO E FARE ATTENZIONE IN CASI DI VICINANZA CON FRUTTETI IN FIORITURA)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (CADUTA PETALI-SCAMICIATURA)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIODICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO;
TIRAM+CAPTANO AL MASSIMO 2 INTERVENTI)

TORTRICIDI

SI SEGNALANO ATTACCHI SPORADICI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE SULLE LARVE CHE ATTACCANO I FRUTTICINI CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FIORITURA)

TICCHIOLATURA

VISTE LE RECENTI PRECIPITAZIONI, ANCHE SE NON PARTICOLARMENTE INTENSE, E VISTA LA CONCESSIONE DI DEROGA PER TRATTAMENTI IN FIORITURA CONTRO LA TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, PER CHI NON FOSSE RIUSCITO AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)
(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

ABBINARE IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE).

CILIEGIO

(FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A FIORITURA ULTIMATA CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..)

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TIRAM (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO

(FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)

AFIDE NERO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO E FARE ATTENZIONE IN CASI DI VICINANZA CON FRUTTETI IN FIORITURA)

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

PIRIMOR* (VARI)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

SUSINO

(FINE FIORITURA)

AFIDI/TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, A FIORITURA ULTIMATA, CON PRODOTTI A BASE DI:

***IMIDACLOPRID** (CONFIDOR, ECC..)AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO E PRESTARE ATTENZIONE NEI CASI VICINANZA CON FRUTTETI CONFINANTI IN FIORITURA).

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*COMPLESSIVAM MAX 1 INTERV/ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (FINE FIORITURA)

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
TIRAM (VARI)(AL MASSIMO 2 INTERVENTI, MAX 1 IN CASO DI UTILIZZO DI ZIRAM).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

