



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

### BOLLETTINO N° 03

18/04/2018

### PESCO (FIORITURA)

#### MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI E VISTA LA CONCESSIONE DI DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI IN FIORITURA CONTRO TALE AVVERSITÀ, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**DIFENOCONAZOLO**(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIODIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH)

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

#### ALBICOCCO

(FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)

#### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**CAPTANO**(VARI)(MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

**TIRAM** (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO;

TIRAM+CAPTANO AL MASSIMO 2 INTERVENTI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO (FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)

---

### AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, TERMINATA LA FASE DI FIORITURA, CON PRODOTTI A BASE DI:

**IMIDACLOPRID (CONFIDOR)** (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

**ACETAMIPRID (EPIK)**

OPPURE

**SPIROTETRAMAT (MOVENTO)**

(AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO CONTRO L'AVVERSITÀ)

## CILIEGIO-SUSINO (FIORITURA)

---

### MONILIA

VISTA LA CONCESSIONE DI DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI IN FIORITURA ALLE DRUPACEE CONTRO TALE AVVERSITÀ, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A FIORITURA ULTIMATA CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)** (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (BOTTONI BIANCHI)

---

### TICCHIOLATURA

VISTA LA FASE FENOLOGICA DI RECETTIVITÀ VERSO IL PATOGENO, IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:**

**DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

OPPURE

**PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)**

OPPURE

**MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)**

OPPURE

**DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)**

OPPURE

**FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)**

OPPURE

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (BOTTONI BIANCHI)

---

### OIDIO

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**ZOLFO (VARI)** (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

