



Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 03**  
**20/03/2019**

### **PESCO** **(FIORITURA)**

VISTA LA FASE FENOLOGICA E LE CONDIZIONI CLIMATICHE, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

### **ALBICOCCO** **(FINE FIORITURA-CADUTA PETALI)**

#### **MONILIA**

VISTA LA FASE FENOLOGICA, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)**

OPPURE

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

**PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 1 INTERVENTO)**

OPPURE

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)**

OPPURE

**PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)**

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (GEMME GONFIE)

---

### CORINEO

VISTE LA FASE FENOLOGICA, IN SITUAZIONI A RISCHIO PER VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)**

## SUSINO (BOTTONI SEPARATI)

---

### CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)**

OPPURE

**\*TIRAM (VARI – MASSIMO 3 KG/HA)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)**

(\* I PRODOTTI A BASE DI TIRAM SONO IMPIEGABILI SOLAMENTE COME SMALTIMENTO SCORTE E NON OLTRE IL 30-04)

## MELO (ORECCHIETTE DI TOPO-MAZZETTI AFFIORANTI)

---

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI PRE-FIORITURA CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO

(ORECCHIETTE DI TOPO-MAZZETTI AFFIORANTI)

---

### TICCHIOLATURA

SIAMO GIÀ NELLA FASE FENOLOGICA DI RECETTIVITÀ VERSO POSSIBILI INFEZIONI: VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI PER CUI SI RIMANDA ALLE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

