



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 04**

04/04/2014

### **PESCO-SUSINO** (FINE FIORITURA)

#### **AFIDI**

PER LE AZIENDE CHE NON HANNO EFFETTUATO ANCORA TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**IMIDACLOPRID\*** (CONFIDOR ETC..) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO).

SI RICORDA CHE PER IL SUSINO IL PRODOTTO È EFFICACE ANCHE SU TENTREDINE

OPPURE

**ACETAMIPRID\*** (EPIK)

OPPURE

**THIAMETOXAM\*** (ACTARA)

(\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

#### **CILIEGIO** (FIORITURA)

#### **MONILIA**

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI INFORMA CHE E' STATA CONCESSA LA DEROGA DAL SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE PER INTERVENIRE IN FASE DI FIORITURA CONTRO LA MONILIOSI DELLE DRUPACEE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO\*** (SIMITAR 5 EW ETC..)

**TEBUCONAZOLO\*** (FOLICUR SE ETC..)

**PROPICONAZOLO\*** (VARI)

(\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI DUE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) (MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO-SUSINO (FINE FIORITURA) ALBICOCCO(SCAMICIATURA)

### MONILIA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI RICORDA CHE A CADUTA PETALI E' POSSIBILE EFFETTUARE UN INTERVENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)**

**CYPRODINIL (CHORUS)**

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')  
OPPURE

**FENBUCONAZOLO\* (SIMITAR 5 EW)**

**MICLOBUTANIL \*(THIOCUR FORTE)**

**TEBUCONAZOLO\* (FOLICUR SE)**

**PROPICONAZOLO\* (VARI)**

(\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI QUATTRO VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ; MASSIMO TRE INTERVENTI ALL'ANNO SU ALBICOCCO)

### MELO

(MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI BIANCHI)

### TICCHIOLATURA

SIAMO NELLA FASE DI RECETTIVITÀ DELLA COLTURA VERSO IL PATOGENO: IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI DI COPERTURA (PER I PRODOTTI VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

