



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 04
06/05/2020

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO TRAMITE CONTROLLO VISIVO E TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIANO PRESENZA DI LARVE ED ADULTI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA I GENERAZIONE.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE ENTRO QUESTA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)
OPPURE

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

AFIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO
OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO
OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)
OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO QUESTA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI TRATTARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA A BASE DI:**

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDE GRIGIO

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (ED A FIORITURA ULTIMATA), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE, ENTRO QUESTA SETTIMANA, CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI) (AZIONE ANCHE CONTRO I TORTRICIDI RICAMATORI)

OPPURE

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE (INIZIO PROSSIMA SETTIMANA) SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL*, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO*, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

* PER MICLOBUTANIL E TEBUCONAZOLO MASSIMO 2 INTERVENTI

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

