



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 05

09/04/2014

PESCO (FINE FIORITURA)

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

QUINOXIFEN*+MICLOBUTANIL (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)

(SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO)

BOLLA-CORINEO

NEI FRUTTETI A RISCHIO, ED IN QUELLI IN CUI SI RISCONTRA PRESENZA D'INFEZIONI SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE RINNOVARE LA COPERTURA





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (FINE FIORITURA)

SI RICORDA CHE **IN FASE DI SCAMICIATURA** E' POSSIBILE INTERVENIRE CONTRO LE SEGUENTI AVVERSITÀ

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
THIRAM (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)

AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI ROSA)

RICAMATORI

NEI MELETI A RISCHIO SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUVALINATE (MAVRIK)(AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)
(EFFICACE ANCHE CONTRO AFIDI)

AFIDE GRIGIO

ENTRO LA FASE DI BOTTONI ROSA SI PUÒ INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI)(AL MASSIMO UN TRATTAMENTI ALL'ANNO
CONTRO L'AVVERSITÀ)

ACETAMIPRID (EPIK) (AL MASSIMO DUE TRATTAMENTI ALL'ANNO)
PIRIMICARB (PIRIMOR)

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI ROSA)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MAZZETTI SEPARATI-BOTTONI ROSA)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO, PERCHÉ COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

QUINOXIFEN*+MICLOBUTANIL (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

ZOLFO (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

