



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05

23/05/2018

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

FACENDO SEGUITO AL PRECEDENTE BOLLETTINO, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO)

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO)

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MONILIA/OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI AD INFEZIONI, PER CHI NON AVESSE EFFETTUATO I TRATTAMENTI CONSIGLIATI FINO AD ORA, SI RACCOMANDA DI UNIRE AL TRATTAMENTO INSETTICIDA UN PRODOTTO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI)

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

VISTA LA FASE FENOLOGICA ALTAMENTE A RISCHIO E LE ATTUALI CONDIZIONI CLIMATICHE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON **PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:**

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

PROPINEB (VARI) (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)(MASSIMO 6 TRATTAMENTI DI CUI SOLO 3 A DOSE MASSIMA)

OPPURE

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

OPPURE

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

OPPURE

FLUAZINAM (BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO T.C.60 GG)

OPPURE

FLUXAPYROXAD (SERCADIS) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, A SEGUITO DI PRECIPITAZIONI SI RICORDA DI AGGIUNGERE IN MISCELA **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:**

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA
VEDI INDICAZIONI PER IL MELO

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI)

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

*SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIROIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

BUPIRIMATE (NIMROD)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

MACULATURA BRUNA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

TIRAM (VARI) (AL MASSIMO 4 INTERVENTI/ANNO)

FOSETIL AL (VARI) (VEDI ETICHETTA PER LIMITAZIONI D'USO)

PSILLA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ABAMECTINA (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO)

SPINETORAM (DELEGATE WDG)(AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

VEDI INDICAZIONI PER IL MELO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET* (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

SPINETORAM (DELEGATE)(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

