



Coldiretti Alessandria



COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
03/04/2019

PESCO **(CADUTA PETALI)**

AFIDI

A FIORITURA ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOL (CLOSER) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SPIROTETRAMAT(MOVENTO)(MASSIMO DUE TRATTAMENTI)

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO

MONILIA/OIDIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

DIFENOCONAZOLO(SCORE 25 EC, ETC..)(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

(SI RICORDA CHE I P.A IBE HANNO ANCHE AZIONE ANTIODIDICA: AL MASSIMO 4 TRATTAMENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)*

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)*

(*MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO COMPLESSIVAMENTE)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (SCAMICIATURA)

MONILIA

VISTO IL CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE E LA FASE DI FIORITURA ORMAI TERMINATA, SI CONSIGLIA UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL* (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL* (CHORUS)

(*MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR SE)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO(VARI)(MAX 2 INTERVENTI ALL'ANNO)

TORTRICIDI

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE SULLE LARVE CHE ATTACCANO I FRUTTICINI CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (BOTTONI ROSA-INIZIO FIORITURA) TICCHIOLATURA

E' STATA CONCESSA LA DEROGA PER TRATTAMENTI IN FIORITURA CONTRO LA TICCHIOLATURA DELLE POMACEE: VISTE LE RECENTI PERTURBAZIONI, IN CASO DI PIOGGE INFETTANTI E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)
(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

ABBINARE IN MISCELA CON I PRODOTTI DI COPERTURA :

MANCOZEB (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

METIRAM (POLIRAM) (MASSIMO TRE TRATTAMENTI ENTRO FRUTTO NOCE)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.) (AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (FIORITURA)

MONILIA

A SEGUITO DELLE RECENTI PREVISIONI DI PIOGGIA È STATA CONCESSA LA DEROGA PER TRATTAMENTI IN FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) (MASSIMO DUE INTERVENTI)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH)

(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

