



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 06  
28/04/2015

### MELO (CADUTA PETALI)

#### TICCHIOLATURA

VISTE LE RECENTI PRECIPITAZIONI, SI RICORDA CHE E' NECESSARIO MANTENERE LA COPERTURA CONTRO LE TICCHIOLATURA DELLE POMACEE, IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG**

OPPURE

**DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)**

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE AGGIUNGENDO AI PRODOTTI DI COPERTURA, I PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA A BASE DI:

**PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)**

**(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)**

OPPURE CON

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, IL

**DIFENOCONAZOLO: 96 ORE DI RETROATTIVITA', PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)**





Coldiretti Alessandria



## MELO (CADUTA PETALI)

---

### OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN\*** (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

**ZOLFO** (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)

### TORTRICIDI RICAMATORI

SI SEGNALANO ATTACCHI LOCALIZZATI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI RIFERIMENTO PER VALUTARE LA NECESSITÀ O MENO DI UN INTERVENTO SPECIFICO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO

(SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### BOLLA

SI SEGNALANO INFEZIONI IN CONTINUO SVILUPPO PER CUI SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**DODINA (VARI)**(EFFICACE ANCHE PER CORINEO)

### OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN\*** (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)

OPPURE

**ZOLFO BAGNABILE** (VARI)

OPPURE

**PROPICONAZOLO\*\*** (VARI) (SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

(\*\*I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI 4 VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

## CILIEGIO

(SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDI

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**IMIDACLOPRID\*** (CONFIDOR) (EFFETTUARE LO SFALCIO DELLE FIORITURE NATURALI PRIMA DEL TRATTAMENTO)

OPPURE

**ACETAMIPRID\*** (EPIK)

OPPURE

**THIAMETOXAM\*** (ACTARA)

(\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO

(SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CORINEO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**THIRAM (VARI) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO ENTRO LA FASE DI SCAMICIATURA)**

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)**

OPPURE

**TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.**

OPPURE

**PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.**

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG.**

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

