



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 06**  
**10/04/2019**

**MELO**  
**(FIORITURA)**

**TICCHIOLATURA**

VISTE LE RECENTI PERTURBAZIONI E VISTA LA CONCESSIONE DI DEROGA PER TRATTAMENTI IN FIORITURA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

**MANCOZEB (VARI)** (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)

OPPURE

**FLUAZINAM** (NANDO MAXI, ETC..)

OPPURE

**DITHIANON** (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

**PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)**

**(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)**

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (CADUTA PETALI) AFIDI/TENTREDINE

IN SITUAZIONI A RISCHIO PER PRESENZA DI DANNI NELLE PASSATE STAGIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE, A FIORITURA ULTIMATA, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DELTAMETRINA\*** (DECIS EVO ETC..)

OPPURE

**BETA-CIFLUTRIN\*** (BAYTEROID 25 EC)

\* AL MASSIMO UN INTERVENTO ALL'ANNO COMPLESSIVAMENTE

### MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A FINE FIORITURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL** (CHORUS)\*

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH)\*

(\*COMPLESSIVAM MAX 1 INTERV/ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

