



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 07
23/04/2014

PESCO (SCAMICIATURA-INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

STIAMO EFFETTUANDO IL MONITORAGGIO DELL'INSETTO CON LE TRAPPOLE A FEROMONI: AL MOMENTO SI REGISTRANO ANCORA CATTURE DI ADULTI DELLA PRIMA GENERAZIONE PER CUI NON SI PREVEDONO INTERVENTI SPECIFICI NEL BREVE PERIODO.

OIDIO

NELLE SITUAZIONI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)
QUINOXIFEN*+MICLOBUTANIL (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)

OPPURE

PROPICONAZOLO (VARI)

(SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FINE FIORITURA - INIZIO ALLEGAGIONE)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE **PREVENTIVAMENTE** CON PRODOTTI DI COPERTURA A BASE DI:

DITHIANON (DELAN WG)

OPPURE

PROPINEB (ANTRACOL 70 WG)(MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO
ENTRO LA FASE DI CADUTA PETALI)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO)(MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA**

PIRIMETANIL (SCALA) / CIPRODINIL (CHORUS)
(CON ANILINOPIRIMIDINE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE CON

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

