



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 07

13/06/2018

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE NEI PROSSIMI GIORNI CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

OPPURE

(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C. 5 GG

OPPURE

PROPICONAZOLO* (VARI) T.C. 14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)

OPPURE

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

NONOSTANTE SIAMO NELLA FASE FINALE DELL'INFEZIONE PRIMARIA, VISTE IL PERDURARE DELL'INSTABILITÀ CLIMATICA, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DODINA (VARI) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.) (MASSIMO 6 TRATTAMENTI DI CUI SOLO 3 A DOSE MASSIMA)

OPPURE

FLUAZINAM (BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO T.C.60 GG)

OPPURE

CAPTANO (VARI) (AL MASSIMO 12 INTERVENTI COMPLESSIVI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FORMULATI A BASE DI ZOLFO (TIOPRON, ETC.)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA
VEDI INDICAZIONI PER IL MELO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

SIAMO ORMAI NELLA FASE FINALE DELLA PRIMA GENERAZIONE: SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(MAX 1 INT. A 4,0 LT./HA)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA ASPORTARE I GETTI COLPITI OPPURE DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

BUPIRIMATE (NIMROD)

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA VEDI INDICAZIONI PER IL MELO

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

