



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 08

30/04/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI, NEI FRUTTETI A RISCHIO (PER DANNI NEGLI ANNI PRECEDENTI), E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA , CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)
(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

BOLLA DEL PESCO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, PER LE AZIENDE CHE NON HANNO ANCORA EFFETTUATO I TRATTAMENTI CONSIGLIATI PRECEDENTEMENTE, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

THIRAM (POMARSOL 80 WG) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IL PERDURARE DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE INSTABILI E LA DELICATA FASE FENOLOGICA, IMPONGONO LA MASSIMA ATTENZIONE VERSO LO SVILUPPO DELLE INFEZIONI.

SI CONSIGLIA PERTANTO DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA**, DA MISCELARE CON I PRODOTTI DI COPERTURA

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA ED IN SITUAZIONI DI SCARSA ALLEGAGIONE, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI **CALCIO**.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

SI SEGNA LA PRESENZA IN ALCUNI FRUTTETI DI LARVE DI RICAMATORI GEOMETRIDI: IN TALI SITUAZIONI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

