



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 08  
13/05/2015

### PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### CYDIA MOLESTA

IN BASE AL MONITORAGGIO CON LE TRAPPOLE A FEROMONI ED AI MODELLI PREVISIONALI, SIAMO NELLA **FASE LARVICIDA** PIÙ O MENO AVANZATA (A SECONDA DELLE POSIZIONI DEI PESCHETI) DELLA 1° GENERAZIONE PER CUI, **PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO** OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO)**

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

**SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

**INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO)**

#### OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

**QUINOXIFEN\* (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)**

**QUINOXIFEN\*+MICLOBUTANIL (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)**

**BUPIRIMATE (NIMROD)**

**ZOLFO BAGNABILE (VARI)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

SI SEGNA LA PRESENZA DI MACCHIE D'INFEZIONE PRIMARIA, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRESTARE ATTENZIONE E PROSEGUIRE LA DIFESA MANTENENDO LA COPERTURA IN CASO DI PREVISIONI DI PIOGGIA (VENERDÌ), CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70WG)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO ANCORA LA PRESENZA ELEVATA DI ADULTI: SOLAMENTE NEI MELETI PIÙ ESPOSTI E' INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI ATTENDERE INDICAZIONI D'INTERVENTO CON I PROSSIMI BOLLETTINI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO IN FASE DI OVIDEPOSIZIONE AVANZATA ED ALL'INIZIO DELLA FASE LARVALE : NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE SUCCESSIVAMENTE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

