



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08

20/06/2018

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE BOLLETTINO, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)
T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO) T.C 7 GG
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG (MASSIMO 1 INTERV./ANNO)
- TEBUCONAZOLO+FLUOPYRAM (LUNA EXPERIENCE) T.C. 3 GG
(MASSIMO 2 INT./ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA.

CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO: TRATTARE SOLAMENTE IN PRESENZA DI BACATO FRESCO CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA.

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VEDI INDICAZIONI PER IL MELO





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA ASPORTARE I GETTI COLPITI OPPURE DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

BUPIRIMATE (NIMROD)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTI I DATI DEI MONITORAGGI, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

