Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08
30/04/2019

PESCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO CON TRAPPOLE A FEROMONI E DEI MODELLI PREVISIONALI REGIONALI, E' CONSIGLIABILE INIZIARE AD UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** , CON PRODOTTI A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 2 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

IN PRESENZA DI INFEZIONI O SU CULTIVAR SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD)
OPPURE
ZOLFO BAGNABILE (VARI)

BOLLA

IN PRESENZA DI INFEZIONI DI BOLLA SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
DODINA (VARI) (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

MANCOZEB *(VARI)* (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO ENTRO CADUTA PETALI)
FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
OPPURE
DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)
(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)
OPPURE
FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)
OPPURE
PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)
(MICLOBUTANIL,FENBUCONAZOLO,TEBUCONAZOLO,DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

AFIDE GRIGIO

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON INTERVENTI SPECIFICI (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE, A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA, PRODOTTI AD **AZIONE OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA