



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08
25/06/2020

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA):

VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - **TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
 - **DIFENOCONAZOLO** (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - **BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - **PENTHIOPYRAD** (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
 - **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
- (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
- FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
 - TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
- (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SIAMO NELLA FASE INIZIALE DELLA SECONDA GENERAZIONE: IN QUESTA FASE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI TRATTARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA A BASE DI:**

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

ETOFENPROX (TREBON,) (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

NON SI SEGNALANO NOVITÀ PARTICOLARI PER CUI SI CONSIGLIA DI FARE RIFERIMENTO AL BOLLETTINO PRECEDENTE

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PRESENZA DI INFEZIONI IN ATTO ED IN PREVISIONE DI BAGNATURE FOGLIARI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

VITE (PRE-CHIUSURA GRAPPOLO)

FLAVESCENZA DORATA

SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2020, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON **PRODOTTI ABBATTENTI** A PARTIRE DA SABATO 27 GIUGNO CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*).

PRINCIPI ATTIVI IMPIEGABILI SU VITE CONTRO LE CICALINE PER AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox (Trebon up, Sword up)	Fenossibenzil eteri	14
Taufluvalinate (Klartan, Mavrik)	Piretroidi	21
Acrinatrina (Rufast)	Piretroidi	30
Flupyradifurone (Sivanto)	Butenolidi	14
Acetamiprid (Epik)	Neonicotinoidi	7-14

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: **QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFODEO).**
- NON EFFETTUARE TRATTAMENTI INSETTICIDI IN FIORITURA
- EFFETTUARE LO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SOTTOSTANTE IN PRESENZA DI FIORITURE SPONTANEE
- EVITARE **FENOMENI** DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

