




Coldiretti Alessandria



**Confagricoltura**  
Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 09**

07/05/2014

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **CYDIA MOLESTA**

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE** (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)  
(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE** (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

#### **OIDIO**

VISTE LE CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

**QUINOXIFEN\*** (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

**QUINOXIFEN\*+MICLOBUTANIL** (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)

OPPURE

**ZOLFO BAGNABILE** (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

### TICCHIOLATURA

SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70WG)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA, DA MISCELARE CON I PRODOTTI DI COPERTURA

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE NEI MELETI IN FASE FENOLOGICA PIU' AVANZATA: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE APPENA POSSIBILE CON FORMULATI AD AZIONE OVICIDA A BASE DI:

**TRIFLUMURON (ALSYSTIN)**

OPPURE

**DIFLUBENZURON (DIMILIN)**

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)**

(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

**TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)**

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA ED IN SITUAZIONI DI SCARSA ALLEGAGIONE, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI **CALCIO**.

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE E' INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: NEI FRUTTETI DANNEGGIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

**CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)**

OPPURE SUCCESSIVAMENTE CON **PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:**

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

OPPURE

**SPINOSAD (LASER) T.C. 7 GG. (MASSIMO 3 INT./ANNO)**

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI SI PREVEDE DI INTERVENIRE SULLA SECONDA GENERAZIONE.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.**

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

