



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 09
20/05/2015

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN BASE AL MONITORAGGIO CON LE TRAPPOLE A FEROMONI ED AI MODELLI PREVISIONALI, SIAMO ALLA FINE DELLA **FASE LARVALE** PER CUI AL MOMENTO SI CONSIGLIA DI NON INTERVENIRE E DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

SI SEGNA LA PRESENZA DI MACCHIE D'INFEZIONE PRIMARIA, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRESTARE ATTENZIONE E PROSEGUIRE LA DIFESA MANTENENDO LA COPERTURA IN CASO DI PREVISIONI DI PIOGGIA (VENERDÌ), CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (*OHAYO, BANJO*) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE* (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

TRIFLUMURON*(ALSYSTIN)(MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO D'INFEZIONE ED IN QUELLI COLPITI DAL PATOGENO NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIROIDICO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA ED IN SITUAZIONI DI SCARSA ALLEGAGIONE, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI **CALCIO**.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

