



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 09

27/06/2018

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI
ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE
LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)
T.C. 15 GG**

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

SPINETORAN (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA

OIDIO

SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO
SPECIFICO (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO
DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN
PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO) T.C 7 GG
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG (MASSIMO 1 INTERV./ANNO)
- TEBUCONAZOLO+FLUOPYRAM (LUNA EXPERIENCE) T.C. 3 GG
(MASSIMO 2 INT./ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO: TRATTARE SOLAMENTE IN PRESENZA DI BACATO FRESCO CON PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA**.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI

DELTAMETRINA, LAMBDA CIALOTRINA (MASSIMO UN INTERVENTO COMPLESSIVAMENTE CON PIRETROIDI)

THIACLOPRID (MASSIMO UN INTERVENTO)

ACETAMIPRID (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA INOLTRE CHE FORMULATI A BASE DI **CLORPIRIFOS METILE** ED **ETOFENPROX** HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO QUESTO INSETTO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

VITE (PRE-CHIUSURA GRAPPOLO)

FLAVESCENZA DORATA

SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2018, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ABBATTENTI DA LUNEDÌ 2 LUGLIO A SABATO 7 LUGLIO CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*).

PRINCIPI ATTIVI CONSIGLIATI SU VITE PER IL PRIMO TRATTAMENTO CONTRO LE CICALINE **AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA** (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15

SI RICORDA CHE DA QUEST'ANNO I FORMULATI A BASE DI CLORPIRIFOS ETILE NON SONO IMPIEGABILI IN QUESTA FASE FENOLOGICA.

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).
- EVITARE FENOMENI DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

