



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 09
08/05/2019

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA MOLESTA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ATTUALI ED IN PARTICOLARE LE BASSE TEMPERATURE STANNO RALLENTANDO LO SVILUPPO FENOLOGICO DEGLI INSETTI: PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI SPECIFICI PUÒ ANCORA INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE).

BOLLA

LE ATTUALI CONDIZIONI METEOROLOGICHE SONO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI NUOVE INFEZIONI: E' POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

DODINA (VARI) (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

ALBICOCCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CORINEO

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E LA FASE FENOLOGICA, IN SITUAZIONI A RISCHIO PER VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (VARI – MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO) (T.C. 21 GG)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

OPPURE

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'AVANZAMENTO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE, A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA, CON FORMULATI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI) (AZIONE ANCHE CONTRO I TORTRICIDI RICAMATORI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

BUPIRIMATE (NIMROD)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE ATTUALI ED IN PARTICOLARE LE BASSE TEMPERATURE STANNO RALLENTANDO LO SVILUPPO FENOLOGICO DEGLI INSETTI: PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI SPECIFICI PUÒ ANCORA INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

