



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 10  
27/05/2015

### PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

#### CYDIA MOLESTA

COME DA PRECEDENTE BOLLETTINO, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

### MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

#### TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA IN CASO DI PREVISIONI DI PIOGGIA, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70WG)**

OPPURE

**FLUAZINAM** (*OHAYO, BANJO*) T.C.60GG **(MASSIMO 3**  
**TRATTAMENTI/ANNO)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO IN FASE LARVALE AVANZATA DELLA I GENERAZIONE, PER CUI PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO CON I FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA OPPURE IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE AL PIÙ PRESTO CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)**

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)**

### OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTIODIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN\* (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)**

OPPURE

**ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)**

OPPURE

**BUPIRIMATE (NIMROD)**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO)

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)  
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

(SI RICORDA CHE I P.A. INDICATI SONO EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*: IN CASO DI ATTACCHI VISIBILI, SI PREGA DI SEGNALARE AI TECNICI DI RIFERIMENTO)

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

