



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 10

04/07/2018

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)
T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

SPINETORAN (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA

ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI (ATTENZIONE AI PRODOTTI).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO) T.C 7 GG
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG (MASSIMO 1 INTERV./ANNO)
- TEBUCONAZOLO+FLUOPYRAM (LUNA EXPERIENCE) T.C. 3 GG
(MASSIMO 2 INT./ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'INIZIO DELLA SECONDA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE ALL'INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA, CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE* (INTREPID) (MASSIMO 3 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

THIACLOPRID (CALYPSO) (EFFICACE ANCHE CONTRO AFIDE VERDE-
AL MASSIMO 1 INTERVENTO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI SEGNALE RISCHIO D'INFEZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO ED IN CASO D'INFEZIONE, DI ELIMINARE MANUALMENTE I GETTI COLPITI.

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

PSILLA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LAVAGGI IN PRESENZA DI MELATA, OPPURE L'IMPIEGO DI PRODOTTI A BASE DI:

SPIROTETRAMAT (MOVENTO): 1 TRATTAMENTO/ANNO

SPINETORAM (DELEGATE WDG): 1 TRATTAMENTO/ANNO

SALI DI POTASSIO (FLIPPER)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI DELTAMETRINA, LAMBDA CIALOTRINA (MASSIMO UN INTERVENTO COMPLESSIVAMENTE CON PIRETROIDI) THIAACLOPRID (MASSIMO UN INTERVENTO) ACETAMIPRID (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA INOLTRE CHE FORMULATI A BASE DI CLORPIRIFOS METILE ED ETOFENPROX HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO QUESTO INSETTO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

