



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 10
16/05/2019

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO TRAMITE CONTROLLO VISIVO E TRAPPOLE A FEROMONI EVIDENZIANO BASSA PRESENZA DI LARVE ED ADULTI PER CUI SI CONSIGLIA DI ASPETTARE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

SUSINO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (DUE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

OPPURE

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 2 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

OPPURE

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

OPPURE

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(MAX 1 INT. A 4,0 LT./HA)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

