



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 11
21/06/2017

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL PRECEDENTE BOLLETTINO, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE ATTUALI, SI CONSIGLIANO INTERVENTI DI COPERTURA **SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA.**

CARPOCAPSA

VISTI I DATI DEI MONITORAGGI, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI SEGNALE RISCHIO D'INFEZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO ED IN CASO D'INFEZIONE, DI ELIMINARE MANUALMENTE I GETTI COLPITI.





Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDE LANIGERO

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LAVAGGI OPPURE INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

- IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)
- ACETAMIPRID* (EPIK)
- THIAMETOXAM* (ACTARA)
- SPIROTETRAMAT (MOVENTO)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)

PESCO-ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
 - DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO SOLO SU PESCO)
- (CON IBE MASSIMO 3 INT. PER ALBICOCCO E 4 INT. PER PESCO)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTI I DATI DEI MONITORAGGI, SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEL PROSSIMO BOLLETTINO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (MATURAZIONE)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET* (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

OPPURE

SPINOSAD* (SPINTOR FLY) T.C. 7GG (AL MASSIMO 5 INTERVENTI LOCALIZZATI)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK) (AL MASSIMO 1 INTERVENTO)

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

