



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 11

13/07/2018

PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO) T.C 7 GG (CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) T.C. 3 GG (MASSIMO 1 INTERV./ANNO)
- TEBUCONAZOLO+FLUOPYRAM (LUNA EXPERIENCE) T.C. 3 GG (MASSIMO 2 INT./ANNO)

ALBICOCCO

(MATURAZIONE)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE UN INTERVENTO IN PRE-RACCOLTA CON PRODOTTI SPECIFICI (ATTENZIONE AI PRODOTTI).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'AVANZAMENTO DELLA SECONDA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI SEGNALE RISCHIO D'INFEZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO ED IN CASO D'INFEZIONE, DI ELIMINARE MANUALMENTE I GETTI COLPITI.

PERO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

PSILLA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE LAVAGGI IN PRESENZA DI MELATA, OPPURE L'IMPIEGO DI PRODOTTI A BASE DI:

SPIROTETRAMAT (MOVENTO): 1 TRATTAMENTO/ANNO

SPINETORAM (DELEGATE WDG): 1 TRATTAMENTO/ANNO

SALI DI POTASSIO (FLIPPER)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:
EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
OPPURE
FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.
OPPURE
SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI
DELTAMETRINA, LAMBDA CIALOTRINA (MASSIMO UN INTERVENTO COMPLESSIVAMENTE CON PIRETROIDI)
THIACLOPRID (MASSIMO UN INTERVENTO)
ACETAMIPRID (MAX 2 INTERVENTI/ANNO)

SI RICORDA INOLTRE CHE FORMULATI A BASE DI **CLORPIRIFOS METILE** ED **ETOFENPROX** HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO QUESTO INSETTO.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

