Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO
VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 11
22/05/2019

PESCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE: DAI MONITORAGGI IN CAMPO NON RISULTA PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE L'INIZIO DELLA NUOVA GENERAZIONE E LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI

SUSINO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

MELO
(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI O PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI PIOGGE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)
OPPURE
DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)
(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)
OPPURE
FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)
OPPURE
PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER CHI NON RIUSCISSE AD INTERVENIRE PREVENTIVAMENTE, SI CONSIGLIA DI TRATTARE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA** A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)
(MICLOBUTANIL,FENBUCONAZOLO,TEBUCONAZOLO,DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO
(INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
OPPURE
TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
OPPURE
(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
OPPURE
FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
OPPURE
TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CILIEGIO
(INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 GG.
FOSMET *(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.
ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG
* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Coldiretti Alessandria

Confagricoltura Alessandria

CIA Alessandria

CILIEGIO

(INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SPINETORAM (DELEGATE)(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG
DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)T.C. 7 GG
ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA