



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 12**  
28/05/2014

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **CYDIA MOLESTA**

COME DA PRECEDENTE BOLLETTINO, SI CONSIGLIA DI NON INTERVENIRE E DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

### **MELO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **TICCHIOLATURA**

VISTA LA FASE FENOLOGICA ANCORA CRITICA PER IL PATOGENO, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (DELAN 70WG)**

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)**

IN CASO DI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLE PIOGGE, SI RICORDA CHE E' POSSIBILE INTERVENIRE ENTRO LE 72 ORE DALL'INIZIO DELL'INFEZIONE CON **PRODOTTI AD AZIONE CURATIVA**, DA MISCELARE CON I PRODOTTI DI COPERTURA

**IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)**

(MICLOBUTANIL, FENBUCONAZOLO, TEBUCONAZOLO, DIFENOCONAZOLO, PENCONAZOLO, TETRACONAZOLO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I° GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

### OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO, VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIROIDICO SPECIFICO A BASE DI:

**QUINOXIFEN\*** (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

**QUINOXIFEN\*+MICLOBUTANIL** (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

**ZOLFO** (VARI)(IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

**BUPIRIMATE** (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO)

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

**ETOFENPROX** (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

**FOSMET** (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' **AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA** CONTRO TALE AVVERSITA'.





Coldiretti Alessandria



## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA ED IN SITUAZIONI DI SCARSA ALLEGAGIONE, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI CALCIO.

## SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CYDIA FUNEBRANA

COME DA PRECEDENTE BOLLETTINO, SI CONSIGLIA DI NON INTERVENIRE E DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

