




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 12
11/06/2015

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

SI CONFERMANO I DATI DI MONITORAGGIO PRECEDENTI E CIOÈ DI FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN SITUAZIONI DI POSSIBILE INEFFICACIA DEI TRATTAMENTI EFFETTUATI PER LE PIOGGE DI QUESTI GIORNI, SI RICORDA CHE È ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA , A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)
(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

THIOACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI.

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

ZOLFO (THIOPRON) (ATTIVO ANCHE CONTRO OIDIO)

CARPOCAPSA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I° GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

AFIDE VERDE

SI SEGNALANO PRESENZA DI ATTACCHI SPORADICI : IN TALI CASI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FLONICAMID (TEPPEKI) (MAX 2 TRATT/ANNO)

OPPURE

PIRIMICARB (PIRIMOR 17,5)

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO 48 SC) T.C. 21GG (MAX 1 TRATT/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LA DELICATA FASE FENOLOGICA IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO E MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO E 3 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

