



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 13

04/06/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO CON TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE E' INIZIATO IL SECONDO VOLO DEGLI ADULTI: NELLE ZONE PIÙ AVANZATE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE NEL FINE SETTIMANA I PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA, A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)
(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

THIOACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTE LE CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI PUÒ CONSIDERARE CONCLUSA LA FASE CRITICA DI DIFESA, UTILIZZANDO PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI. PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

ZOLFO (THIOPRON) (ATTIVO ANCHE CONTRO OIDIO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I° GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

OIDIO

SI SEGNALANO INFEZIONI IN ATTO, VISTE LE CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDIO SPECIFICO A BASE DI:

QUINOXIFEN* (ARIUS) (*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)

OPPURE

QUINOXIFEN*+MICLOBUTANIL (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)

OPPURE

ZOLFO (VARI) (IN CASO DI PRECEDENTI TRATTAMENTI CON OLIO MINERALE, SI RICORDA DI INTERVENIRE CON ZOLFO DOPO ALMENO 10 GG.)

OPPURE

BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(CON IBE MASSIMO 2 INT./ANNO SU CILIEGIO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO)

(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

SI RICORDA CHE E' **AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA** CONTRO TALE AVVERSITA'.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.
- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

