



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 13

17/06/2015

PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN RIFERIMENTO A QUANTO INDICATO NEL BOLLETTINO PRECEDENTE, PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)(MAX 2 INT./ANNO)
T.C. 30 GG

OPPURE

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG

OPPURE

BACILLUS THURINGENSIS (VARI) T.C. 3 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI.

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (*EFFICACE ANCHE CONTRO ALTERNARIA*)(OHAYO, BANJO)
(MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO)T.C.60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

ZOLFO (THIOPRON) (*ATTIVO ANCHE CONTRO OIDIO*)

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO I MODELLI PREVISIONALI SEGNALANO LA PRESENZA DI ADULTI E L'INIZIO DELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE (II° GEN) NEI MELETI IN FASE FENOLOGICA PIU' AVANZATA: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)

(MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

TEBUFENOZIDE (MIMIC) (MASSIMO 4 INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

SI RICORDA CHE TALI P.A. HANNO AZIONE ANCHE CONTRO I **TORTRICIDI RICAMATORI**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LA DELICATA FASE FENOLOGICA IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO E 3 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

