



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 13
05/07/2017

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(MASSIMO 1 INT./ANNO - 4,5 LT./HA DI FORMULATO ALL'ANNO) T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 14GG

ETOFENPROX (TREBON) (2 INT./ANNO) T.C. 7GG

BACILLUS TH. (VARI) (2 INT./ANNO)

SPINOSAD (LASER) (3 INT./ANNO) T.C. 7GG

SUSINO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO IN DEROGA TERRITORIALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

VISTE L'ASSENZA DI PRECIPITAZIONI NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI DI COPERTURA.

CARPOCAPSA

IL MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE SIAMO IN FASE LARVALE (INIZIO) DELLA II GENERAZIONE, PER CUI, PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO CON I FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA OPPURE IN PRESENZA DI DANNI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 7GG

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

OIDIO

IN PRESENZA DI ATTACCHI DIFFUSI (SI CONSIGLIA IN TALI CASI L'ASPORTAZIONE DEI GETTI COLPITI), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO-ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO SOLO SU PESCO)
(CON IBE MASSIMO 3 INT. PER ALBICOCCO E 4 INT. PER PESCO)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI **CLORPIRIFOS METILE** NELLA **FORMULAZIONE LOW ODOR** A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA PER L'UTILIZZO IN CASO DI AVVERSITA'.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

