



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 13
14/06/2019

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

CYDIA MOLESTA

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)
OPPURE
CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)
(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG
OPPURE
ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C. 5 GG
OPPURE
PROPICONAZOLO* (VARI) T.C. 14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO; SI RICORDA CHE IL P.A. HA AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA)
OPPURE
FENBUCONAZOLO* (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)

IN CASO DI INFEZIONI IN ATTO SI CONSIGLIA DI ASPORTARE I GETTI COLPITI





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) CARPOCAPSA

I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO CHE SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA PRIMA GENERAZIONE: SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (VEDI BOLLETTINO PRECEDENTE)

AFIDI

VISTA LA FASE FENOLOGICA, IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO), SI CONSIGLIA COMUNQUE DI CONTATTARE I TECNICI PER INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SPIROTETRAMAT (MOVENTO) AL MASSIMO UN INTERVENTO/ANNO
OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO
OPPURE

SULFOXAFLOR (CLOSER) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO
OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, SU VARIETÀ PRECOCI E SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)
OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTHINVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON) T.C. 7 GG.

FOSMET*(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTHINVAIATURA)

DROSOPHILA SUZUKII

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI RICORDA CHE È POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SPINETORAM (DELEGATE)(AL MASSIMO UN INTERVENTO) T.C. 7 GG

DELTAMETRINA (VARI)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)T.C. 7 GG

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

OPPURE

CYANTRANILIPROLE* (EXIREL) T.C 14 GG)(AL MASSIMO UN INTERVENTO)

**AUTORIZZAZIONE IN DEROGA REGIONALE DEL 31/05/2019*

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

