



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 14**

11/06/2014

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **CYDIA MOLESTA**

I DATI DEL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO CON TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI CONFERMANO L'INIZIO DEL SECONDO VOLO DEGLI ADULTI SU TUTTO IL TERRITORIO: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA, A BASE DI:

**METOSSIFENOZIDE** (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY) (MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

**CLORANTRANILIPROLE** (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

**THIOACLOPRID** (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)(ATTIVO ANCHE IN PRESENZA DI AFIDI)

(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

PER INTERVENTI SUCCESSIVI OPPURE IN SITUAZIONI PARTICOLARMENTE ANTICIPATE SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

**CLORPIRIFOS ETILE** (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)(MAX 2 INT./ANNO)

OPPURE

**CLORPIRIFOS METILE** (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO)

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

**SPINOSAD** (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

**INDOXACARB** (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**ETOFENPROX** (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO)

OPPURE

**FOSMET** (SPADA) (2 INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### TICCHIOLATURA

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI PUÒ CONSIDERARE CONCLUSA LA FASE CRITICA DI DIFESA, UTILIZZANDO PRODOTTI DI COPERTURA CON TURNI DI INTERVENTO PIÙ ALLUNGATI RISPETTO A QUANTO CONSIGLIATO FINO AD OGGI. PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (750 G./HA)** (DELAN 70WG)

OPPURE

**FLUAZINAM (OHAYO, BANJO)** (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

**DODINA (VARI)** (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

**ZOLFO (THIOPRON)** (ATTIVO ANCHE CONTRO OIDIO)

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE PROSSIME INDICAZIONI RELATIVE ALLA II° GENERAZIONE

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**: SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO-ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(IBE: MAX 2 INT./ANNO SU CILIEGIO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO SU PESCO E 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## CILIEGIO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX (TREBON) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA 200 EC) T.C. 10 GG.

OPPURE

**SPINOSAD** (SPINTOR FLY) (*USO STRAORDINARIO PER DEROGA REGIONALE*)

SI RICORDA CHE E' **AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA** CONTRO TALE AVVERSITA'.

### MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (*DROSOPHYLA SUZUKII*)

SONO SEGNALATE A LIVELLO NAZIONALE/REGIONALE CATTURE DI ADULTI CON PRESENZA DI UOVA E LARVE SUI FRUTTI INVAIATI: IN CASO DI PRESENZA DELL'INSETTO, SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI PER EVENTUALI INTERVENTI SPECIFICI (*DEROGA REGIONALE PER TRATTAMENTI SPECIFICI*)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' **OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN** QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È **OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO** QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

