





## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

## BOLLETTINO N° 14 19/07/2017

# PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### CYDIA MOLESTA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.)(MASSIMO 1 INT./ANNO - 4,5 LT./HA DI FORMULATO ALL'ANNO) T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7GG INDOXACARB (STEWARD) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 14GG

ETOFENPROX (TREBON) (2 INT./ANNO)T.C. 7GG

BACILLUS TH. (VARI) T.C 3 GG

SPINOSAD (LASER) (3 INT./ANNO) T.C. 7GG

## **SUSINO**

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### CYDIA FUNEBRANA

ÎN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG. OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

**OPPURE** 

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

**OPPURE** 

**SPINETORAM** (DELEGATE WG) (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO IN DEROGA TERRITORIALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE).









### MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

VISTE L'ASSENZA DI PRECIPITAZIONI NON SI CONSIGLIANO INTERVENTI SPECIFICI DI COPERTURA.

#### CARPOCAPSA

ÎN PRESENZA DI DANNI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

**OPPURE** 

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

**OPPURE** 

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 7GG

## PESCO (MATURAZIONE)

#### MONII IA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 gg)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG. (MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO (CON IBE COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 4 INTERVENTI)

#### **OPPURE**

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 gg. (Massimo 2 interventi/anno)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 gg. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)









### MELO-PERO-PESCO-(MATURAZIONE)

## CIMICE (HALYOMORPHA HALYS)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI **CLORPIRIFOS METILE** NELLA **FORMULAZIONE LOW ODOR** A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA PER L'UTILIZZO IN CASO DI AVVERSITA'.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

