



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

**BOLLETTINO N° 15**  
01/07/2015

### **PESCO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **CYDIA MOLESTA**

PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI  
ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE  
LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA)

#### **OIDIO**

SI SEGNA LA PRESENZA DI ATTACCHI SU FOGLIA, SI CONSIGLIA  
PERTANTO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI:

**QUINOXIFEN\*** (ARIUS) (\*MASSIMO 3 TRATTAMENTI ALL'ANNO)  
**QUINOXIFEN\*+MICLOBUTANIL** (ARIUS SYSTEM PLUS) (CON IBE  
MAX 4 TRATTAMENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ)  
**BUPIRIMATE** (NIMROD)  
**ZOLFO BAGNABILE** (VARI)

### **MELO** (INGROSSAMENTO FRUTTI)

#### **TICCHIOLATURA**

PER LE AZIENDE CHE AD OGGI NON HANNO AVUTO INFEZIONI, IN GENERALE SI  
CONSIGLIA FINITA LA DIFESA PER CUI SI RITIENE DI NON CONSIGLIARE PIÙ  
TRATTAMENTI .

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA  
IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON  
PRODOTTI A BASE DI:

**DITHIANON (750 G./HA)** (DELAN 70WG)(MAX 12 INTERVENTI  
COMPLESSIVI TRA DITIANON E CAPTANO)  
**FLUAZINAM(OHAYO, BANJO)** (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG  
OPPURE  
**DODINA (VARI, T.C. 40 GG)** (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI SIAMO IN FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

**CLORPIRIFOS ETILE** (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG

OPPURE

**CLORPIRIFOS METILE** (RELDAN 22, ETC.)(2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

**FOSMET** (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM) T.C. 7 GG (MAX2 INT./ANNO)

### AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**: IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

**IMIDACLOPRID\*** (CONFIDOR)

OPPURE

**ACETAMIPRID\*** (EPIK)

OPPURE

**THIAMETOXAM\*** (ACTARA)

OPPURE

**SPIROTETRAMAT** (MOVENTO)

(\*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO PER L'AVVERSITÀ)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

---

### MONILIA

VISTE LA DELICATA FASE FENOLOGICA IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**FENBUCONAZOLO** (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

**TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

**PROPICONAZOLO** (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

**FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**CYPRODINIL+FLUDIOXONIL** (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

**BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO E 3 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

**TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

