




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 15
26/07/2017

PESCO (MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

I DATI DI MONITORAGGIO SEGNALANO UNA MODESTA PRESENZA DI CATTURE: SI CONSIGLIA DI PROSEGUIRE I TRATTAMENTI MANTENENDO LA COPERTURA CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) : VEDI BOLLETTINI PRECEDENTI

SUSINO (MATURAZIONE)

CYDIA FUNEBRANA

I MONITORAGGI SEGNALANO RIPRESA DI CATTURE PER CUI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.
OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO IN DEROGA TERRITORIALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MATURAZIONE)

CARPOCAPSA

I MONITORAGGI SEGNALANO UN'ELEVATA RIPRESA DELLE CATTURE PER CUI SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE UTILIZZANDO FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 7GG

PESCO-SUSINO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO** (MASSIMO 3INT/ANNO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

- **TEBUCONAZOLO (FOLICUR)** T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

- **CIPROCONAZOLO (SCORE)**(MASSIMO 2INT/ANNO
(CON IBE COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE (TELDOR)** T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

- **BOSCALID (CANTUS)** T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI CLORPIRIFOS METILE NELLA FORMULAZIONE LOW ODOR A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA PER L'UTILIZZO IN CASO DI AVVERSITA'.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

VITE (INVAIATURA)

FLAVESCENZA DORATA

SI RICORDA CHE, SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, PER L'ANNO 2017 SIAMO IN TEMPO UTILE PER EFFETTUARE IL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*).

PRINCIPI ATTIVI CONSIGLIATI NEL TORTONESE SU VITE PER IL SECONDO TRATTAMENTO CONTRO LE CICALINE AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
TIAMETOXAM	Neonicotinoidi	21
ACETAMIPRID	Neonicotinoidi	14

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).
- EVITARE FENOMENI DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

