



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 15
01/07/2019

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)
T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

THIACLOPRID (CALIPSO) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 14 GG

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI/MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
 - TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
 - DIFENOCONAZOLO (SCORE)(MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS)T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

MONILIA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

VITE (PRE-CHIUSURA GRAPPOLO)

FLAVESCENZA DORATA

SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2019, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ABBATTENTI DA MARTEDÌ 2 LUGLIO A DOMENICA 7 LUGLIO CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*).

PRINCIPI ATTIVI CONSIGLIATI SU VITE PER IL PRIMO TRATTAMENTO CONTRO LE CICALINE **AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA** (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14
Taufluvallinate	Piretroidi	21
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: **QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).**
- EVITARE FENOMENI DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

