



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 16

16/07/2015

PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO CON TRAPPOLE A FEROMONI ED I MODELLI PREVISIONALI INDICANO CHE E' INIZIATA LA FASE DI OVIDEPOSIZIONE DELLA TERZA GENERAZIONE: SI CONSIGLIA PERTANTO, SOPRATTUTTO SU VARIETÀ TARDIVE, DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA , A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID, GLADIATOR, PRODIGY)

(MASSIMO 4 INTERVENTI) T.C. 7 GG

OPPURE

THIOACLOPRID (CALYPSO) (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)

(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA) T.C. 14 GG

IN VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTE OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, IN ALTERNATIVA IMPIEGARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE AL MOMENTO NON SUSSISTONO CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ TALI DA GIUSTIFICARE ALCUN TIPO DI TRATTAMENTO

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO SULLA II GENERAZIONE OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 30 GG

OPPURE

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) T.C. 7 GG (MAX2 INT./ANNO)

AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**: IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO PER L'AVVERSITÀ)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LA DELICATA FASE FENOLOGICA IN SITUAZIONI A RISCHIO, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C. 14 GG.

(CON IBE MASSIMO 4 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO E 3 INT/ANNO SU PESCO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SECONDO QUANTO INDICANO I MODELLI PREVISIONALI, SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA II GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE ANCORA INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MAX TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

