



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 16
24/08/2017

PESCO (MATURAZIONE)

CYDIA MOLESTA

PER LE ULTIME VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, IN PRESENZA DI
ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON
PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI
CARENZA) :

- **EMAMECTINA BENZOATO** (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 7GG
- **INDOXACARB** (STEWARD) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG
- **ETOFENPROX** (TREBON) (2 INT./ANNO) T.C. 7GG
- **BACILLUS TH.** (VARI) T.C 3 GG
- **SPINOSAD** (LASER) (3 INT./ANNO) T.C. 7GG

SUSINO (MATURAZIONE)

CYDIA FUNEBRANA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI PRODOTTI
AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO IN
DEROGA TERRITORIALE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE).





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MATURAZIONE)

CARPOCAPSA

NONOSTANTE LA FASE COLTURALE AVANZATA, I MONITORAGGI SEGNALANO ELEVATA PRESENZA DI ADULTI PER CUI SI CONSIGLIA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE UTILIZZANDO FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO T.C.7 GG)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO T.C. 28 GG)

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO TRE INT./ANNO) T.C. 7GG

MELO (MATURAZIONE)

MARCIUMI DA CONSERVAZIONE

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FLUDIOXONIL (GEOXE)(MASSIMO UN INT./ANNO) T.C. 7GG**

- **BOSCALID + PIRACLOSTROBIN (BELLIS) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C. 7GG**

- **CAPTANO (TRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 12 TRATT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')T.C.21G.G.**

CONTRO L'AVVERSITÀ AL MASSIMO UN INT/ANNO (DUE INTERVENTI/ANNO PER LE CULTIVAR RACCOLTE DOPO IL 15 SETTEMBRE)

MELO (MATURAZIONE)

BUTTERATURA AMARA

NEI MELETI SOGGETTI A TALE FISIOPATIA, SI CONSIGLIA DI RIPRENDERE I TRATTAMENTI CON CALCIO PER VIA FOGLIARE.

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA,





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO-SUSINO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (MASSIMO 3 INT/ANNO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C. 7 GG. (MASSIMO 2 INT/ANNO)
- CIPROCONAZOLO (SCORE) (MASSIMO 2 INT/ANNO (CON IBE COMPLESSIVAMENTE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C. 3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO-PERO-PESCO- (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, E' POSSIBILE INTERVENIRE CON FORMULATI A BASE DI **CLORPIRIFOS METILE** NELLA **FORMULAZIONE LOW ODOR** CON FORMULATI A BASE DI **DELTAMETRINA** (DECIS EVO E DECIS PROTECT EW) A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA PER L'UTILIZZO IN CASO DI AVVERSITA'.

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica

