



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

**BOLLETTINO N° 16**  
**24/07/2019**

### **PESCO** **(MATURAZIONE)**

#### **CYDIA MOLESTA**

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

**CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)**  
T.C. 15 GG

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG**

**INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG**

**FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG**

**SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG**

**ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**

**BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA**

### **SUSINO** **(MATURAZIONE)**

#### **CYDIA FUNEBRANA**

SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.**

OPPURE

**SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.**

OPPURE

**ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.**

OPPURE

**ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO-SUSINO (MATURAZIONE)

---

### MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
  - TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
  - DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C.7 GG. SOLO SU PESCO (MASSIMO 2INT/ANNO)
- (CON IBE MASSIMO 5 INTERVENTI SU PESCO E 4 INTERVENTI SU SUSINO)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) SOLO SU PESCO T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

### MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

---

### CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

**CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)**

OPPURE

**EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)**

OPPURE

**FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)**

OPPURE

**SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG**





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## PESCO- (MATURAZIONE)

---

### CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.

## ALBICOCCO (MATURAZIONE)

---

### *CAPNODIS TENEBRIONIS*

SI SEGNA LA PRESENZA DI TALE COLEOTTERO CHE PROVOCA DANNI ALLE DRUPACEE IN FASE LARVALE (SULLE RADICI DELLE PIANTE) ED IN FASE DI ADULTO (DEFOGLIAZIONE): IN CASI RICONDUCEBILI ALLA PRESENZA DELL'INSETTO SULLA COLTURA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

**In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.**

