



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 17
02/07/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

SIAMO IN PIENA FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE PER CUI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX)(MAX 2 INT./ANNO)
T.C. 30 GG

OPPURE

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO) T.C. 15 GG

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (MASSIMO 3 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

OPPURE

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 28 GG

OPPURE

BACILLUS THURINGENSIS (VARI) T.C. 3 GG





Coldiretti Alessandria



MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI SIAMO IN FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO CON I FORMULATI AD AZIONE OVO-LARVICIDA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLOPPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**: IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (OHAYO, BANJO) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (VARI) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

VISTO LO SVILUPPO DELL'INSETTO IN BASE AL MONITORAGGIO ED AI MODELLI PREVISIONALI, IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (TRE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

SPINOSAD (LASER) (TRE INT./ANNO) T.C. 7 GG.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(IBE: MAX 2 INT./ANNO SU CILIEGIO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO SU PESCO E 2 INTERVENTI/ANNO)

VITE

CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA





Coldiretti Alessandria



(PRE-CHIUSURA GRAPPOLO)

FLAVESCENZA DORATA

SI RICORDA CHE, SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE, PER L'ANNO 2014 I TRATTAMENTI INSETTICIDI CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*) VANNO EFFETTUATI **NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 30 GIUGNO ED IL 4 LUGLIO**: PER I PRODOTTI DA IMPIEGARE LA STRATEGIA CONSIGLIATA PREVEDE PRODOTTI A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, DURSBAN, PYRINEX ME, ALISE' 75 WG, TERIAL 75 WG ETC..) RISPETTANDO LE DOSI DI ETICHETTA

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: **QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)**.
- LO SFALCIO E APPASSIMENTO/ASPORTAZIONE DELLA VEGETAZIONE SOTTOSTANTE NEL CASO DI PRESENZA DI FIORITURE SPONTANEE PRIMA DI ESEGUIRE I TRATTAMENTI INSETTICIDI.
- EVITARE FENOMENI DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I TECNICI DI ZONA

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI NC, XI E XN SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (XN, T O T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

