



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 17
31/07/2019

PESCO **(MATURAZIONE)**

CYDIA MOLESTA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI

CLOPPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (MASSIMO 1 INT./ANNO)
T.C. 15 GG

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG

BACILLUS T. (VARI) T.C. VEDI ETICHETTA

SUSINO **(MATURAZIONE)**

CYDIA FUNEBRANA

SI CONSIGLIA DI IMPIEGARE PRODOTTI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV/ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WG) (UN INT./ANNO) T.C. 7 GG.

OPPURE

ACETAMIPRID (EPIK) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG.

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

PESCO-SUSINO (MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)
- DIFENOCONAZOLO (SCORE) T.C.7 GG. SOLO SU PESCO (MASSIMO 2INT/ANNO)

(CON IBE MASSIMO 5 INTERVENTI SU PESCO E 4 INTERVENTI SU SUSINO)

OPPURE

- FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- PENTHIOPYRAD (FONTELIS) SOLO SU PESCO T.C.3 GG.(MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
- TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MELO

(INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (COMPLESSIVAMENTE UTILIZZARE AL MASSIMO 4,0 LT/HA DI FORMULATO ALL'ANNO)

OPPURE

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OPPURE

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO 1 INT./ANNO) T.C. 7GG





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (MATURAZIONE)

MARCIUMI DA CONSERVAZIONE

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE (GRUPPO GALA), SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

CAPTANO (TRA CAPTANO E DITHIANON AL MASSIMO 12 TRATT./ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITÀ) T.C. 21 G.G.

BOSCALID + PYRACLOSTROBIN (BELLIS) AL MASSIMO 3 TRATT./ANNO T.C. 7 G.G

FLUDIOXONIL (GEOXE) AL MASSIMO 1 TRATT./ANNO T.C. 3 G.G

CONTRO L'AVVERSITÀ AL MASSIMO UN INT/ANNO (DUE INTERVENTI/ANNO PER LE CULTIVAR RACCOLTE DOPO IL 15 SETTEMBRE)

PESCO (MATURAZIONE)

CIMICE (*HALYOMORPHA HALYS*)

IN CASO DI PRESENZA DIFFUSA DELLA CIMICE ASIATICA, CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.

ALBICOCCO (MATURAZIONE)

CAPNODIS TENEBRIONIS

SI SEGNA LA PRESENZA DI TALE COLEOTTERO CHE PROVOCA DANNI ALLE DRUPACEE IN FASE LARVALE (SULLE RADICI DELLE PIANTE) ED IN FASE DI ADULTO (DEFOGLIAZIONE): IN CASI RICONDUCEBILI ALLA PRESENZA DELL'INSETTO SULLA COLTURA SI CONSIGLIA DI CONTATTARE I TECNICI DI ZONA.





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

VITE (CHIUSURA GRAPPOLO)

FLAVESCENZA DORATA

SECONDO QUANTO COMUNICATO DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2019, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO IL 6 AGOSTO CONTRO IL VETTORE DELLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE (*SCAPHOIDEUS TITANUS*).

PRINCIPI ATTIVI CONSIGLIATI SU VITE PER IL SECONDO TRATTAMENTO CONTRO LE CICALINE **AZIENDE IN PRODUZIONE INTEGRATA** (che aderiscono all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020)

Sostanza attiva		Intervallo di sicurezza (gg)
ACETAMIPRID	EPIK	14
FLUPIRADYFURONE	SIVANTO	14

SI RACCOMANDA:

- DOPO AVER TRATTATO CON L'INSETTICIDA E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) SI RACCOMANDA DI ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI: **QUESTO SERVE PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO)**.
- EVITARE FENOMENI DI DERIVA (NON TRATTARE IN PRESENZA DI VENTO).

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistono diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

