



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

BOLLETTINO N° 18
09/07/2014

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

VISTA LA FASE DI SVILUPPO DELL'INSETTO, AL MOMENTO NON SONO PREVISTI INTERVENTI SPECIFICI: SI CONSIGLIA PERTANTO DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

SULLA BASE DEI DATI DI MONITORAGGIO TRAMITE LE TRAPPOLE A FEROMONI SIAMO IN FASE LARVALE DELLA II GENERAZIONE: PER CHI NON FOSSE INTERVENUTO OPPURE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON FORMULATI AD **AZIONE LARVICIDA** A BASE DI:

CLORPIRIFOS ETILE (DURSBAN 75 WG, PYRINEX) (AL MASSIMO 2 INT./ANNO)

CLORPIRIFOS METILE (RELDAN 22, ETC.) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO TRE INT./ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA SPORADICA DI COLONIE DI **AFIDE LANIGERO**:
IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA INTERVENIRE CON
PRODOTTI SPECIFICI A BASE DI

IMIDACLOPRID* (CONFIDOR)

OPPURE

ACETAMIPRID* (EPIK)

OPPURE

THIAMETOXAM* (ACTARA)

OPPURE

SPIROTETRAMAT (MOVENTO)

(*PRODOTTI IN ALTERNATIVA TRA LORO: AL MASSIMO 1 INTERVENTO
ALL'ANNO)

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

TICCHIOLATURA

PER GLI IMPIANTI COLPITI SI CONSIGLIA DI CONTINUARE LA COPERTURA
IN PREVISIONE DI PIOGGIA O POSSIBILI BAGNATURE FOGLIARI, CON
PRODOTTI A BASE DI:

DITHIANON (750 G./HA) (DELAN 70WG)

OPPURE

FLUAZINAM (*OHAYO, BANJO*) (MASSIMO 3 TRATTAMENTI/ANNO) T.C. 60GG

OPPURE

DODINA (*VARI*) (MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

ALBICOCCO-PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA)

MONILIA

VISTE LE SITUAZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA MALATTIA, PER ATTACCHI PRECEDENTI E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR 5 EW, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.

OPPURE

PROPICONAZOLO (OPINION, ETC..) T.C.14 GG.

(IBE: MAX 2 INT./ANNO SU CILIEGIO, 3 INT./ANNO SU ALBICOCCO E 4 INT./ANNO SU PESCO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH) T.C.7 GG. (14 GG. PER ALBICOCCO) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

BOSCALID (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 3 INTERVENTI/ANNO SU PESCO E 2 INTERVENTI/ANNO)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T o T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T o T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

