



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013/AZIONE 214.1

### BOLLETTINO N° 18

26/11/2015

### CILIEGIO - ALBICOCCO - SUSINO

(CADUTA FOGLIE)

---

### CORINEO - BATTERIOSI

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN TRATTAMENTO CON PRODOTTI A BASE DI :

**RAME** (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA)

### PESCO

(CADUTA FOGLIE)

---

### BOLLA

SI CONSIGLIA IN QUESTO PERIODO DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**\*ZIRAM** (PER TUTTI I FORMULATI COMMERCIALI AL 76% DI P.A. : MASSIMO 3 KG/HA PER I FORMULATI IN FORMA LIQUIDA MASSIMO 4,5 KG/HA)

OPPURE

**\*TIRAM** (PER TUTTI I FORMULATI COMMERCIALI ALL'80% DI P.A. : MASSIMO 3 KG/HA, PER I FORMULATI IN FORMA LIQUIDA MASSIMO 4,5 KG/HA)

(PER ZIRAM E TIRAM E' CONSIGLIABILE LA MISCELA CON RAME VISTA LA LIMITAZIONE NEI DOSAGGI)

OPPURE

**\*CAPTANO** (VARI)

OPPURE

**DODINA** SEGUIRE LE LIMITAZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA (MASSIMO 2 TRATTAMENTI/ANNO)

OPPURE

**RAME** (VARI) (EFFICACE ANCHE CONTRO BATTERIOSI E CANCRI RAMEALI)

*\* Massimo tre interventi: Tiram e Ziram sono in alternativa tra di loro ed al massimo 2 trattamenti all'anno (per il formulato commerciale TRISCABOL al massimo 1 intervento/anno) Con Captano al massimo 2 interventi/anno*





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

## MELO (CADUTA FOGLIE)

---

NEI MELETI FORTEMENTE COLPITI DA TICCHIOLATURA SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE TRATTAMENTI A BASE DI UREA (3-4%) AL FINE DI RIDURRE L'INOCULO PER LA PROSSIMA STAGIONE VEGETATIVA.

(SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE ABBONDANTI BAGNATURE ANCHE SULLE FOGLIE GIA' CADUTE A TERRA).

## MELO PERO (CADUTA FOGLIE)

---

### CANCRI RAMEALI

A CADUTA FOGLIE ULTIMATA SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

**RAME** (DOSAGGIO: COME DA ETICHETTA)

**N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.**

- E' OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn QUANDO DELLA STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO ANCHE FORMULAZIONI DI CLASSE TOSSICOLOGICA T O T+.

- È OBBLIGATORIO DARE PREFERENZA ALLE FORMULAZIONI Nc, Xi e Xn SENZA FRASI DI RISCHIO QUANDO DELLA

STESSA SOSTANZA ATTIVA ESISTANO FORMULAZIONI A DIVERSA CLASSE TOSSICOLOGICA (Xn, T O T+) CON FRASI

DI RISCHIO RELATIVE AD EFFETTI CRONICI SULL'UOMO (R40, R48, R60, R61, R62, R63, R68);

